

ESQUEMA DE VACUNACION RECOMENDADO POR LA ASOCIACION PEDIATRICA HONDUREÑA AÑO 2008

VACUNA	NACIMIENTO	2 MESES	4 MESES	6 MESES	12 MESES	15 MESES	18 MESES	4-6 AÑOS	11 -12 AÑOS
BCG	BCG								
HEPATITIS B	HEPATITIS B								
HEXAVALENTE o PENTAVALENTE Y SABIN		DIFTERIA, PERTUSSIS, TETANOS, POLIO, HEPATITIS B, HAEMOPHILUS INFLUENZAE	DIFTERIA, PERTUSSIS, TETANOS, POLIO, HEPATITIS B, HAEMOPHILUS INFLUENZAE	DIFTERIA, PERTUSSIS, TETANOS, POLIO, HEPATITIS B, HAEMOPHILUS INFLUENZAE					
PENTAVALENTE o TETRAVALENTE Y SABIN							DIFTERIA, PERTUSSIS, TETANOS, POLIO, HAEMOPHILUS INFLUENZAE		
TETRAVALENTE o DTP Y SABIN								DIFTERIA, PERTUSSIS, TETANOS, POLIO,	
ROTAVIRUS		ROTAVIRUS	ROTAVIRUS	ROTAVIRUS					
NEUMOCOCO		Neumococo Heptavalente	Neumococo Heptavalente	Neumococo Heptavalente			Neumococo Heptavalente		
SRP					SARAMPIO N PAPERAS RUBEOLA			SARAMPIO PAPERAS RUBEOLA	SARAMPIO PAPERAS RUBEOLA
VARICELA						VARICELA		VARICELA	
INFLUENZA				INFLUENZA			REPETIR CADA AÑO		
PAPILOMAVIRUS									VIRUS PAPILOMA HUMANO(3 DOSIS) INTERVALO 0, 1 Y 6 MESES
HEPATITITS A					HEPATITIS A		HEPATITIS A		