

INTERVENCIONES EN NIÑOS/AS MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD DE ACUERDO AL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO NUTRICIONAL

EVALUAR

OBSERVAR Y PALPAR

Verifique


Presencia de signos de emaciación visible (Marasmo).

Presencia de edema en ambos pies (Kwashiorkor).

En la gráfica de Peso/Longitud-Talla los puntos marcados se encuentran en el espacio que está debajo de la línea de -2 DE hasta la línea de -3 DE (desnutrición aguda moderada).

En la gráfica de Peso/Longitud-Talla los puntos marcados se encuentran en el espacio que está debajo de la línea de -3 DE (desnutrición aguda grave).

En la gráfica de Peso/Longitud-Talla los puntos marcados se encuentran en el espacio que está arriba de la línea de +3 DE (obesidad).



EVALÚE ESTADO NUTRICIONAL

SIGNOS

Presencia de signos de emaciación visible (Marasmo) ó

Presencia de edema en ambos pies (Kwashiorkor) ó

En la gráfica de **Peso/Longitud-Talla** el punto marcado se encuentra en el espacio que está debajo de la línea de -2 DE hasta la línea de -3 DE (desnutrición aguda moderada) ó

En la gráfica de **Peso/Longitud-Talla** el punto marcado se encuentra en el espacio que está debajo de la línea de -3 DE (desnutrición aguda grave) ó

En la gráfica de **Peso/Longitud-Talla** el punto marcado se encuentra en el espacio que está arriba de la línea de +3 DE.

Punto marcado se encuentra en el espacio que está debajo de la línea de -2 DE hasta la línea de -3 DE en la **gráfica de Longitud-Talla/Edad**.

Punto marcado se encuentra en el espacio que está debajo de la línea de -3 DE en la **gráfica de Longitud-Talla/Edad**.

Punto marcado se encuentra en el espacio que está arriba de la línea de +2 DE hasta la línea de +3 DE en la **gráfica de peso para la longitud/talla**.

Puntos marcados en la **gráfica de peso para la longitud o talla** se encuentran en el espacio que está desde la línea de +2 DE hasta la línea de -2 DE y en la **gráfica de longitud o talla para la edad** se encuentran en el espacio que está desde la línea de +3 DE hasta la línea de -2 DE.

CLASIFIQUE

DAÑO NUTRICIONAL GRAVE (AGUDO)

- Menor de 6 meses de edad.
- Baja temperatura corporal (hipotermia).
- Disminución de la conciencia.
- Lesiones graves en la piel, úlceras de decúbito.
- Diarrea o deshidratación.
- Dificultad respiratoria o cianosis.
- Ictericia, tendencia a hemorragia o petequias.
- Anemia grave (palidez intensa)
- Lesiones o úlceras en los ojos.

Si no presenta ningún criterio de mal pronóstico

OBESIDAD

BAJA TALLA

BAJA TALLA SEVERA

SOBREPESO

NORMAL

TRATE

Si además de los signos clínicos, presenta uno o más de los siguientes criterios de mal pronóstico:

- Abigado (mantener el calor del cuerpo).
- Ofrecer sorbos de agua azucarada durante el transporte.
- Dar dosis de Vitamina A según norma y notificar de ello al centro de referencia.

Tratamiento ambulatorio (centro de recuperación nutricional o tratamiento domiciliario supervisado).

Referir a consulta externa de pediatría.

Evalúe el crecimiento y trate de acuerdo a los hallazgos.

Evalúe el crecimiento y trate de acuerdo a los hallazgos.