

SEROPREVALENCIA DE LA INFECCION VIH EN POBLACION DE COMAYAGUA CON RIESGO ELEVADO DE ADQUIRIR VIH/SIDA

DRES. MOHAMMADIAN A.*
ZAPATA N.*
GUTIERREZ A.*
ORTEGA A.*
ALVARADO T.*
Y FERNANDEZ J.*

Se estudia la seroprevalencia por VIH en grupos de alto riesgo en la ciudad de Comayagua, al tiempo que se define el perfil epidemiológico de esos grupos de población, en el afán de conocer más el comportamiento de la infección VIH/SIDA en Honduras. Para ello, se aplicó una encuesta epidemiológica y se rastreó el suero de cada individuo por la presencia de anticuerpos anti-VIH, El universo de estudio comprendió 24 prostitutas ambulantes no controladas en los servicios de salud local, 65 prostitutas y 9 homosexuales bajo control sanitario local, 47 militares y 63 prisioneros.

La seroprevalencia global para VIH fue de 10.1%, variando de 2.1% en militares, 6.3% en prisioneros, 8.3% en prostitutas ambulantes, 15.4% en prostitutas controladas a 44.4% en homosexuales.

Se identificaron 25 varones homosexuales (21% de la población masculina), pero además, se encontró que de 5 prostitutas que admitieron relaciones homosexuales 1 resultó con serología positiva.

Estos resultados fueron entregados a la Región de Salud No. 2 para su utilización en el control epidemiológico local.

* Facultad de Ciencias Médicas y Ministerio de Salud Pública, Honduras.