


Desnutrición y sobrepeso infantil en Honduras según

ENDESA 2005-2006 v patrón de referencia (NCHS v OMS)


Comparación de resultados de desnutrición (ENDESA 2005-2006) con los patrones de la NCHS Y OMS según edad de los niños.



Prevalencia de sobrepeso (>+2Z) infantil por grupo de edad y patrón de referencia, ENDESA 2005-2006

Edad (meses)	NCHS (%)	OMS (%)
3 a 6	9.9	7.7
6 a 12	6.7	7.3
12 a 59	3.3	5.3
3 a 59	4.0	5.7

Tendencia de la prevalencia de sobrepeso (>+2Z) en niños y niñas de 12 a 59 meses de edad según encuesta y patrón de referencia



Según el patrón de referencia NCHS, los niños y niñas de 3 a 59 meses de edad se encontrarían afectados con sobrepeso (>+2Z) de la siguiente manera:

- Por sexo: 3.7% en las niñas y 4.3% en los niños
- Por área de residencia: 6% en el área urbana y el 2.6% en el área rural.
- Los Departamentos de Francisco Morazán (6.3%), Atlántida (6.0%) y Olancho (5.8%) además del Distrito Central (7%) son los que mayor prevalencia de sobrepeso infantil presenta.
- Los hijos/as de madres con mayor nivel de educación e índice de riqueza se encuentran más afectados por sobrepeso (6.5% y 9.6%).