
ALGUNOS FACTORES DE RIESGOS EN MUJERES DE 12 A 60 Y MAS AÑOS POSITIVAS POR LESIONES PRECANCEROSAS Y CANCER CERVICO UTERINO

Concepción Sandoval Medina*

Introducción: Es de reconocimiento a nivel mundial que el comportamiento de las enfermedades crónicas se ha incrementado en la mayoría de los países desarrollados, el cáncer es la segunda causa de mortalidad. (1) . En América Latina, según la OPS; O. M. S. la localización más frecuente del cáncer es en el cuello del útero, mas de 30,000 mujeres mueren anualmente por este tipo de enfermedad. En Honduras la mujer es mas afectada por cáncer que el hombre en una relación de 3:1, según los datos del registro estadístico de la Secretaría de Salud, llegando a constituir mas del 40% de todos los canceres de la población, y mas del 60% de los canceres que se presentan en la mujer. (2). En la Región Sanitaria Departamental No. 3, Comayagua el cáncer de cérvix, ha sido y sigue siendo una enorme preocupación debido a la alta incidencia observada, para el año 2005 el índice de positividad fue de 1.8, en el 2006 fue de 3.0 %; observándose un incremento de 1.2 %. (3). La presente investigación, cuyo propósito es determinar algunos factores de riesgos en mujeres de 12 a 60 y más años positivas por lesiones pre canceroso y cáncer de cervix uterino; haciendo énfasis en aquellas entre 19 y 29 años.

Metodología: Se trata de un estudio cuantitativo, cualitativo, transversal y exploratorio, en 110 mujeres entre 12 y 60 años, con citología positiva por malignidad, para la obtención de datos se aplicó dos instrumentos, el primero permitió la revisión y obtención de información del expediente clínico y el segundo encuesta por medio de una entrevista de mujeres en estudio.

Resultado principal: Las adolescentes y mujeres jóvenes se consideran un grupo de población de alto riesgo, el 68.1% iniciaron sus relaciones sexuales entre 12 a 19 años, siendo marcado este evento entre 16 a 19 años.

El grupo de mujeres menores de 20 años, el 50% presentan el virus papiloma humano (HPV). En el 18.2 % y 12.7% de las mujeres entre 30 a 39 años prevalecen las lesiones pre cancerosas en grado II y III respectivamente. Un 5.4% (6) de las mujeres de 40 a 60 años, su diagnostico es cáncer. Cervicouterino. A mayor edad mayor riesgo de padecer cáncer.

Conclusión: El 50% de las mujeres de 12 a 29 años presentan positividad por virus papiloma humano; con características sobre salientes: bajo nivel de escolaridad, proceden del área marginal, solteras y sexualmente activas. Todas las mujeres en estudio reciben orientación del personal de salud, no obstante es urgente un plan de comunicación más efectivo que enfatice la prevención.

* Región Departamental de Salud No. 3, Comayagua, Honduras.