

W AEDES QUADRIVITATUS, COQUILLET**Descripción de la Hembra Adulta:**

Trompa moderada, uniforme, negra. Occipucio con 3 líneas doradas, separadas por negro, oscuro de oro abajo. Lóbulos protorácicos con una línea dorada. Mesonótum con escamas negras, con cuatro líneas algo curvas, estrechas, doradas sobre toda su longitud; la línea subdorsal sombreada anteriormente,, y allá se encuentra una, sombra dorada en la base del ala; pleura y coxa con manchas de escamas amarillo plateadas. Abdomen negro, con manchas plateadas medianas en los segmentos laterales; vientre con los segmentos amarillentos en la base, anchamente negro en los ápices, el segmento posterior proyectándose ventralmente. Patas negras, fémur con los extremos plateados; primeras dos articulaciones tarsales sobre las patas delanteras y primeros tres sobre la media y pata trasera con anillos básales blancos, más anchos sobre el último par. Alas con escamas angostas y negras.

2° Larva: Desconocida.

Distribución geográfica: Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia y Venezuela.

13° AEDES AEGYPTY, LINNEO**1° Descripción de la Hembra Adulta:**

Trompa más bien larga, delgada, uniforme, negra. Occipucio con escamas negras, una banda blanca sobre el vértice y dos manchas blancas sobre cada lado, un margen blanco en los ojos; clipeo, toro y puntas del palpo con escamas blancas. Mesonótum con escamas castañas; dos líneas angostas doradas en el medio; una banda ancha, plateada y lateral, formando un arco redondo; escamas plateadas como en el espacio antescutelar y sobre el escótel; pleura, coxa con manchas de escamas plateadas. Abdomen negro, con el segmento basal dorsal lunado con manchas; las laterales más plateadas; vientre con escamas blancas, el segmento posterior anchamente con bandas negras apicalmente. Patas negras, fémur con las puntas plateadas; articulaciones tarsales con; anillos anchos en la base, sobre la punta trasera también anchamente, la quinta articulación, toda blanca. Alas con escamas angostas, todas negras.

2° Larva:

Cabeza redondeada, ligeramente combada en los lados; antenas bien pequeñas, delgadas. Pelos de la cabeza todos sencillos. Peine lateral del octavo segmento de ocho a doce escamas separadas, cada una con una espina central y dos más, cortas a los lados. Tubo aéreo como dos y media veces tan largo como ancho, el pei-