

de consentimiento y asentimiento informado, referencia a los principios de bioética, redacción de citas bibliográficas según Vancouver. **Resultados:** El 91.1 % de los trabajos publicados consignan sus objetivos, pero únicamente 52.9 % de ellos estaban adecuadamente redactados. Los diferentes elementos del diseño metodológico son mencionados explícitamente en porcentajes que oscilan entre 58.8 y 85.2%. Solo el 2.9% consigna el origen del financiamiento de la investigación. Un 5.9 % de los trabajos contaron con el aval de un comité de bioética. Un 17.6% aludió al consentimiento y asentimiento informado; ninguno hizo referencia de los principios de bioética. El 97% aplicó adecuadamente las normas de Vancouver. **Conclusión/ Recomendación:** La Revista de los Postgrados de Medicina debe reforzar el reglamento existente y estandarizar la calidad del marco metodológico de los artículos que publica, así como regularizar su periodicidad para ser considerada una revista de referencia en bases de datos internacionales.

24TL. OFIDISMO EN EL HOSPITAL REGIONAL ISRAEL SALINAS ELVIR DEL IHSS DE SAN PEDRO SULA, PERÍODO DE ENERO DE 2005 – ENERO DE 2014. Oscar Armando Ponce Barahona, Cristian Alejandro Milla Matute. Médico General. Universidad Católica de Honduras; San Pedro Sula, Honduras.

Antecedentes: Hace casi 30 años se realizó el único estudio estadístico de prevalencia e incidencia de ofidismo en nuestro país. Desde esa fecha no existe otra publicación del tema. **Objetivo:** Presentar la incidencia de los casos de ofidismo en el Hospital Regional Israel Salinas del IHSS de San Pedro Sula; en el período de enero de 2005 - enero 2014. **Materiales y métodos:** Estudio descriptivo de los casos de ofidismo atendidos en dicho Hospital. Se identificaron 24 casos de un universo de 489,486 pacientes atendidos en dicho período. Se caracterizaron los casos de acuerdo a edad, ocupación, estación del año, tipo de serpiente, características clínicas de la mordedura, severidad del envenenamiento, complicaciones, respuesta terapéutica y mortalidad. **Resultados:** La incidencia de los casos de ofidismo fue de 0.005%. La mayoría de pacientes afectados son adultos que desempeñan labores agrícolas en el departamento de Atlántida (50%). Se observa la mayor incidencia en los meses de estación lluviosa (70%). Más de la mitad de los casos son ocasionados por *Bothrops asper* (barba amarilla). Las mordeduras ocurren más frecuentemente en miembros inferiores (80%). El envenenamiento leve fue prevalente (67%) se observaron pocos severos. La principal

complicación fue la infección (8%). Únicamente el 8% de los pacientes desarrollaron reacciones adversas tempranas a la administración del suero antiofídico, todas leves. La tasa de mortalidad fue del 0%. **Conclusiones/Recomendaciones:** Los empleados de la agroindustria y los poblados rurales son la población de riesgo ante esta patología. *Bothrops asper* es la responsable de la mayoría de los casos de ofidismo en la zona Nor-occidental. El adecuado manejo hospitalario fue responsable de una evolución clínica favorable. Capacitar a todo el personal de salud sobre ofidismo e informar a la población sobre el manejo pre hospitalario adecuado luego de sufrir una mordedura. Crear un protocolo de manejo que incluya clasificación, diagnóstico y tratamiento de pacientes afectados por ofidismo.

25TL. PREVALENCIA DE DISCAPACIDAD Y FACTORES RELACIONADOS EN LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DEL MUNICIPIO DE MARALE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, AÑO 2012-2013. Briana Y. Beltrán,¹ Jackeline Alger,² Ana Jiménez,³ Wilmer Castellanos,³ Sonia Flores,⁴ José Sierra,⁵ Lucía Zúñiga,⁴ Edna Maradiaga,² Mauricio Gonzales.² ¹Médico General (Médico en Servicio Social Período Noviembre 2012 – Noviembre 2013); ²Docente Unidad de Investigación Científica, Facultad de Ciencias Médicas (FCM) UNAH; ³Médico Residente Postgrado de Medicina Física y Rehabilitación, FCM UNAH; ⁴Unidad de Medicina Física y Rehabilitación IHSS Tegucigalpa; ⁵Sociedad de Medicina Física y Rehabilitación, Tegucigalpa, Honduras.

Antecedentes: Discapacidades un término genérico que incluye alteraciones en la función y en las estructuras anatómicas que conlleva a deficiencia, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. La información en Honduras es escasa. **Objetivo:** Analizar la prevalencia de discapacidad en población económicamente activa, factores relacionados y capacidad de respuesta institucional, municipio de Marale, Francisco Morazán, 2012-2013. **Metodología:** Estudio descriptivo transversal, muestra de 50 casas habitadas. La información se obtuvo a través de observación y tres encuestas tipo entrevista. Se realizó búsqueda activa de casos y caracterización de personas con discapacidad previo consentimiento informado escrito. Se utilizó OR, IC95% y $p < 0.05$ para evaluar los factores relacionados. Se evaluó el CESAMO de Marale. **Resultados:** Se encontró 134 personas económicamente activas y 14 personas con discapacidad para una prevalencia de 10.4%. La edad promedio fue 38 años (rango 31-50). El 57.1% (8) pertenecía