cando la semiología perisilviana, insular y/o mesial temporal.^{15,16} Los pacientes pueden permanecer hasta 1-4 meses en situación de SE incontrolable, requiriendo ventilación mecánica y tratamiento con coma barbitúrico hasta en un 75-97% de los casos y con una tasa de mortalidad evolutiva de un 9-30%.^{15,16} Tras semanas o meses de curso del SE, ceden las crisis, salen del coma y, sin periodo libre de síntomas, van a ir desarrollando una encefalopatía epiléptica con epilepsia secuestral evolutiva en un 95-97% de los casos, siendo ésta refractaria hasta en un 90-93%.¹³⁻¹⁷ Se trata habitualmente de crisis con semiología perisilviana o insular que suelen presentarse como reagudizaciones periódicas cada 2-4 semanas. Entre el 66-100% de los pacientes con FIRES desarrollan déficits neurocognitivos y conductuales de grado variable, con afectación primordial de funciones ejecutivas.^{15,16}

El EEG en la fase inicial pone de manifiesto una sobrecarga de ritmos rápidos farmacológicos, un patrón de lentificación difusa "seudoencefálico" o bien un patrón de lentificación fronto-temporal multifocal.¹³⁻¹⁷ El EEG en la fase evolutiva muestra anomalías epileptiformes de localización primordial fronto-temporal.¹³⁻¹⁷ La resonancia magnética (RM) cerebral en la fase de SE es normal en hasta un 55-80% de los casos y, en el resto, pueden objetivarse hiperseñales focales en secuencias T2 y FLAIR en regiones mesiales temporales y/o insulares (Figura 2).¹³⁻¹⁷ La RM cerebral evolutiva, tras 3-6 meses de evolución, puede seguir siendo normal (50%), o bien mostrar atrofia cortico-subcortical difusa o frontotemporal, hiperseñales focales mantenidas en secuencias T2 y FLAIR en hipocampos y/o ínsula, o bien esclerosis mesial temporal.¹³⁻¹⁷ La tomografía de emisión de positrones (PET) cerebral intercrítica en la fase evolutiva

Figura 2. Corte axial de imagen de resonancia magnética cerebral en secuencia FLAIR en la fase inicial de FIRES en un niño de 7 años de edad que muestra hiperseñales en ambas regiones mesiales temporales.

muestra un hipometabolismo focal de localización orbitofrontal y/o parieto-temporal bilateral.^{13,15}

Los estudios de citoquímica de líquido cefalorraquídeo (LCR) son normales o bien muestran una pleocitosis leve (57%) y/o un leve aumento de proteínas (33%).¹³⁻¹⁷ En un 20% de los casos pueden detectarse bandas oligoclonales en LCR.¹⁵ En la mayoría de los casos, los autoanticuerpos del panel de estudio de encefalitis límbicas son negativos, aunque se han descrito positividad para anti-GAD y para anti-GluR3 en un 20% de los casos.¹⁵ La necropsia y/o la biopsia cerebral son totalmente normales en un 50-60% de los pacientes y, en el resto, se describen formas de gliosis inespecífica reactiva en ausencia de inflamación, pérdida neuronal y/o infiltrados leptomeníngeos.¹³⁻¹⁷ Con respecto al tratamiento de la fase inicial del FIRES, el SE se muestra refractario a todos los FAE del mercado, obteniéndose sólo respuestas parciales con dosis altas de fenitoína, fenobarbital y/o perfusión continua de midazolam.¹³⁻¹⁷ Existe controversia respecto a cuándo usar coma barbitúrico con pentobarbital y cuánto tiempo mantenerlo dado que se piensa que este tratamiento se relacionaría con mayor tasa de secuelas neurocognitivas y un mayor riesgo potencial de mortalidad.¹³ Se describe una respuesta positiva a la inmunoterapia parenteral con inmunoglobulinas intravenosas y/o megadosis de corticoides parenterales en un 20-25% de los tratados.¹⁵ En la fase de epilepsia secuestral, las crisis son de muy difícil control y es frecuente llegar a una politerapia de más de 2 FAE, siendo fenobarbital, fenitoína y carbamazepina los FAE con mejor tasa de respuestas.¹³⁻¹⁷ La DC es una alternativa prometedora para el tratamiento inicial del FIRES. Mejora la morbi-mortalidad global y tiene una alta tasa de respuestas (75-80%).^{15,16}

SÍNDROME DE HEMICONVULSIÓN-HEMIPLEJÍA-EPILEPSIA (HHE)

Se trata de un síndrome epiléptico infantil englobado en el grupo de las epilepsias neocorticales graves.¹⁸ Aunque se describieron más de 150 casos entre 1970 y 1980, actualmente es un síndrome extremadamente raro y supone apenas un 0.06% de las epilepsias del niño.¹⁷⁻¹⁹ Se describen formas idiopáticas, muchas veces en el contexto de familias con alta tasa de crisis febriles, y formas secundarias que se han relacionado con patología traumática, vascular, cromosómica, encefalítica y con situaciones de hipercoagulabilidad-trombofilia.^{18,19} Algunos autores, como Nabbout, engloban este síndrome, junto con el FIRES, en el complejo AEIMSE ("acute encephalopathy with inflammation mediated status epilepticus") ligado a un mecanismo inflamatorio mediado por citoquinas.¹⁷

El debut clínico se presenta habitualmente en los 2 primeros años de vida y es infrecuente su inicio antes de los 6 meses o después de los 4 años de edad.^{17,18} En el contexto de una enfermedad febril aguda, tras una crisis clónica unilateral prolongada o tras un auténtico SE focal motor, aparece una hemiplejía aguda que se mantiene fija después del episodio de crisis.¹⁷⁻¹⁹ Posteriormente, hasta un 80% de los